

LIITE**Yleisessä rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet**

<i>Lyhenne</i>	<i>Rokote</i>
BCG	tuberkuloosirokote (<i>Bacillus Calmette-Guerin</i>)
DTaP-IPV-Hib	kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IPV)- ja <i>Haemophilus influenzae</i> tyyppi b (Hib) -rokote
DTaP-IPV	kurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä (aP)- ja polio (IPV) -rokote
dtap	kurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä (ap) -rokote
DT	kurkkumätä (D)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote
dT	kurkkumätä (d)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote
Hib	<i>Haemophilus influenzae</i> tyyppi b (Hib) -rokote
IPV	inaktivoituja tyyppi 1, 2 ja 3 viruksia sisältävä poliorokote
MPR	tuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko (rubella = R) -rokote
HAV	hepatiitti A -rokote
HBV	hepatiitti B -rokote
HAV -HBV	hepatiitti A- ja hepatiitti B -rokote
influenssa	influenssarokote

Rokotteiden antigeenimääriä kuvaavat merkinnät

D, T, P	korkeampi antigeenimäärä
d, t, p	alhaisempi antigeenimäärä

Lasten ja nuorten rokotukset

<i>Rokote</i>	<i>Ikä, jolloin rokotus suositellaan annettavaksi</i>
BCG	< 1 vko
DTaP-IPV-Hib	3 kk
DTaP-IPV-Hib	5 kk
DTaP-IPV-Hib	12 kk
MPR I	14-18 kk
DTaP-IPV	4 v
MPR II	6 v
dtap	14-15 v

Jos rokotusohjelma ei ole toteutunut suositellun aikataulun mukaisesti, rokotussuoja täydennetään puuttuvien rokoteannosten osalta ohjelmaa yksilöllisesti soveltaen.

DtaP-IPV-Hib ja DTaP-IPV –yhdistelmärokotteen sijasta voidaan käyttää myös erillis- tai muita yhdistelmärokotteita, jos se on lääketieteellisesti perusteltua tai jos näitä yhdistelmärokotteita ei ole saatavilla.

Aikuisten rokotukset

Jokaisella aikuisella tulisi olla vähintään kolmen jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotuksen antama suoja. Lisäksi jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan. Jos aikuisen rokotussuoja todetaan näiden rokotusten osalta puutteelliseksi, se täydennetään. Sen jälkeen rokotuksia jatketaan seuraavasti:

dT	tehosterokotus on tarpeen 10 vuoden välein
IPV (Polio)	tehosterokotus vain erityistilanteissa Kansanterveyslaitoksen antamien rokotusaiheiden mukaisesti

Asetuksen 2 §:n mukaiset rokotukset

Seuraavia rokotuksia annetaan Kansanterveyslaitoksen määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti:

<i>Rokote</i>	<i>Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa</i>
HBV	0 vrk
HAV	12 kk
HAV-HBV	12 kk
Influenssa	6 kk