**LIITE**

**TYÖSSÄ TAPAHTUVAN ALTISTUMISEN RAJA-ARVOT**

| Aineen nimi | EINECS [1] | CAS [2] | Raja-arvot mg/m$^3$ [3] | ppm [4] | Huomautus | Siirtymätoimenpiteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentseeni | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | Iho [6] | Raja-arvo 3 ppm 01.06.2003 asti. |
| Vinyylikloridi-monomeeri | 200-831 | 75-01-4 | 7,77 [5] | 3 [5] | - | Tulee voimaan 01.04.2003 |
| Kovapuupölyt | - | - | 5,00 [5], [7] | - | - | Tulee voimaan 01.04.2003 |

[1] EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances

[2] CAS: Chemical Abstract Service Number

[3] mg/m$^3$ = milligrammaa ilmakuutiometriä kohden 20 $^{o}$C lämpötilassa ja 103 Kpa (760 mmHg) paineessa.

[4] ppm = tilavuuden miljoonasosaa ilmassa (ml/m$^3$)

[5] Mitattu tai laskettu suhteessa kahdeksan tunnin viiteaikaan.

[6] Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen on mahdollista ihon kautta altistumalla.

[7] Hengittyvä osuus: jos kovapuupölyjä on sekoittunut muihin puupölyihin, raja-arvoa sovelletaan kaikkiin seoksessa mukana oleviin puupölyihin.